ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ «Курчатовский институт»

*Структурная организация
генома высших организмов:
феномен фрактальной
организации хроматина по
данным МУРН*

РНСИ-КС-2014

29 октября 2014

Санкт-Петербург, Старый Петергоф

тка — элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят, как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию

Ядро (лат. *nucleus*) — это один из структурных компонентов эукариотической клетки, содержащий генетическую информацию (молекулы ДНК), осуществляющий основные функции: хранение, передача и реализация наследственной информации с обеспечением синтеза белка.

Хроматин (греч. χρώματα — цвета, краски) — это вещество хромосом — комплекс ДНК, РНК и белков. Хроматин находится внутри ядра клеток эукариот и входит в состав нуклеоида у прокариот. Именно в составе хроматина происходит реализация генетической информации, а также репликация и репарация ДНК.

ДНК – 30-40% по массе

Гистоновые белки -30-50%

Негистоновые белки и РНК 4-33%

Клеточный цикл — это период существования клетки от момента её образования путем деления материнской клетки до собственного деления или гибели.

Интерфаза (G_2)

Профаза

Spindle poles

Метафаза

Kinetochores

Sister chromatids

Анафаза

Телофаза

Cleavage furrow

Интерфаза (G_2)

Cell cycle

Interphase
comprises the
 G_1 , S and G_2
phases.
Nondividing
cells exit in
 G_0 state.

▲ **FIGURE 1-9 The eukaryotic cell cycle.** In most growing cells, the four phases proceed successively, taking from 10–20 hours depending on cell type and developmental state. Interphase comprises the G_1 , S, and G_2 phases. DNA is synthesized in S, and other cellular macromolecules are synthesized throughout interphase, so the cell roughly doubles its mass. During G_2 the cell is prepared for the mitotic (M) phase, when the genetic material is evenly partitioned and the cell divides. Nondividing cells exit the normal cycle, entering the quiescent G_0 state.

Интерфаза

- период подготовки клетки к делению,
- первый этап клеточного цикла
- Фаза относительного покоя клетки.
- Здесь происходят процессы:
 1. Репликация (удвоение ДНК).
 2. Накопление питательных веществ.
 3. Хромосомы представляют собой вытянутые нитевидные образования.

это период между двумя делениями.

**Глыбки хроматина в
интерфазном ядре**

**1. Нить ДНК в виде хроматина.
2. Она же в виде хромосомы
при делении клетки**

Территориальный принцип упаковки хромосом

chromosome order in HeLa cells J.Walter et al., J. Cell Biol. 2003

ция (от лат. *replicatio* — возобновление) — процесс синтеза дочерней молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты на матрице родительской молекулы ДНК. В ходе последующего деления материнской клетки каждая дочерняя клетка получает по одной копии молекулы ДНК, которая является идентичной ДНК исходной материнской клетки. (полуконсервативная)

Схематическое изображение процесса репликации, цифрами отмечены: (1) запаздывающая нить, (2) лидирующая нить, (3) ДНК-полимераза (Pol α), (4) ДНК-лигаза, (5) РНК-праймер, (6) праймаза, (7) фрагмент Оказаки, (8) ДНК-полимераза (Pol δ), (9) хеликаза, (10) одиночная нить со связанными белками, (11) топоизомераза

Репарация (от лат. *reparatio* — восстановление) — особая функция клеток, заключающаяся в способности исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК, повреждённой при нормальном биосинтезе ДНК в клетке или в результате воздействия физических или химических агентов. Осуществляется специальными ферментными системами клетки

Рекомбинация — процесс обмена генетическим материалом путем разрыва и соединения разных молекул. Рекомбинация происходит при репарации двунитевых разрывов в ДНК и для продолжения репликации в случае остановки репликационной вилки у эукариот, бактерий и архей. У вирусов возможна рекомбинация между молекулами РНК их геномов. Рекомбинация у эукариот обычно происходит в ходе кроссинговера в процессе мейоза, в частности, при формировании сперматозоидов и яйцеклеток у животных.

пция (от лат. *transcriptio* — переписывание) — процесс синтеза **РНК** с использованием **ДНК** в качестве матрицы, происходящий во всех живых клетках. Другими словами, это перенос генетической информации с ДНК на РНК.

Эпигенетика (греч. *επί* — над, выше, внешний) — в биологии, в частности в генетике — представляет собой изучение закономерностей эпигенетического наследования — изменения экспрессии генов или фенотипа клетки, вызванных механизмами, **не затрагивающими последовательности ДНК.**

Эпигенетические изменения сохраняются в ряде митотических делений соматических клеток, а также могут передаваться следующим поколениям. Примерами эпигенетических изменений являются метилование ДНК и деацетилирование гистонов.

е тки — недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся во всех многоклеточных организмах. Стволовые клетки способны самообновляться, образуя новые стволовые клетки, делиться посредством митоза и дифференцироваться в специализированные клетки, то есть превращаться в клетки различных органов и тканей.

Развитие молекулярной и клеточной биологии в последние два десятилетия позволило продвинуться в понимании многих молекулярных механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность клетки.

Накоплен громадный экспериментальный материал, позволяющий в деталях понять отдельные аспекты функционирования конкретных макромолекулярных машин, которые обеспечивают молекулярную основу актов репликации, репарации, клеточного деления, клеточной дифференцировки.

Однако число работ, в которых делается попытка системного взгляда на клетку, как целое остается небольшим и, в основном, пока эти работы содержат дискуссию терминологического плана, касающуюся вопроса, что такое системная биология [Cell 2005].

Не менее интригующий уровень понимания живой системы это клеточное ядро.

Основная парадигма молекулярной биологии - связь структуры и функции.

Понимая, как работают, те или иные гены в составе генома, мы не знаем общих принципов упаковки генома в структуру хроматина ядра. Тем более мы не знаем общих принципов транспорта низкомолекулярных соединений и макромолекулярных комплексов в клеточном ядре.

Такое положение приводит к попыткам создания структурных моделей, которые бы позволили объяснить особенности транспорта в ядре.

Иными словами, нет формального языка, на котором можно говорить об упаковке хроматина в интегральном смысле.

NET RESULT: EACH DNA MOLECULE HAS BEEN PACKAGED INTO A MITOTIC CHROMOSOME THAT IS 50,000x SHORTER THAN ITS EXTENDED LENGTH

Levels of Chromatin Packing

Nucleosome

Nucleosome

The atomic structure of the nucleosome core particle

Zig - Zag Models

FISH

Fluorescence In Situ Hybridization

Flory exponent

Swollen polymer (repulsive forces prevail);

$$R \sim N^{3/5}$$

Collapsed polymer (attractive forces prevail);

$$R \sim N^{1/3}$$

Ideal solvent (θ – point), gaussian polymer

$$R \sim N^{1/2}$$

R – end-to-end distance;
 N – number of monomers;

$R \propto N^{\nu}$
 ν - Flory exponent;

$D_C = 1/\nu$ ‘chain’ dimensionality;

Yokoto Y H et al - 1998

R – radius of sphere;
 N' - number of monomers in R

$M \propto R^{D_m}; R \propto N'^{1/D_m};$

$N' \rightarrow \infty; D_C = D_m$

Lebedev D et al - 2005

Two phases - two polymer-like behavior

Конфокальная микроскопия

Bancaud A et al - 2009

Hi-C

Lieberman-Aiden E et.al 2009

FOLDED POLYMER

Equilibrium globule

Cross-section view

Fractal globule

Cross-section view

Objective

To investigate the higher-order chromatin structure in the native cell nuclei

Method

SANS: wide range of structure size; investigation of protein and nucleic components of chromatin by contrast variation

Model objects

- Chicken erythrocyte nuclei (quiescent nuclei) phase G0
- Nuclei of rat lymphocytes (active nuclei)
- the human cervical adenocarcinoma cell line HeLa
- the Chinese hamster fibroblast cell line A238
- Glioma rat C6
- Glioma human
- Fruit Fly (*Drosophila* embryos)

Получены изображения топографии поверхности ядер клеток высших из различных организмов

Ядро эритроцита курицы

Ядро лимфоцита крысы

Ядро клетки HeLa

Ядро клетки A238

Contrast

$$\Delta\rho = \langle g(\mathbf{r}) \rangle = 1/V \int [\rho(\mathbf{r}) - \rho_s] d\mathbf{r} = \bar{\rho} - \rho_s$$

DNA & RNA = 40% D₂O

Prot = 65% D₂O

A

B

C

D

Рисунок служит иллюстрацией того, как вариации контраста между объектом и его фоном могут изменять вид объекта. *A*. Когда контраст $\bar{\rho}$ велик и положителен, то видна лишь общая форма объекта, но большинство внутренних деталей утеряно. *B*. Вид объекта в отсутствие какого бы то ни было фона. *C*. Когда $\bar{\rho} = 0$, общая форма объекта не просматривается и видны только внутренние неоднородности. *D*. Когда контраст $\bar{\rho}$ велик и отрицателен, ясно обрисовывается общая форма объекта, но видны лишь некоторые внутренние детали.

Small-angle spectrometers used

YuMO: $Q = 7 \cdot 10^{-3} \text{ } 0.5 \text{ \AA}^{-1}$ - Dubna

$\lambda = 0.5 \text{ } 8 \text{ \AA}$;

$d = 12 \div 900 \text{ \AA}$

D11: $Q = 7 \cdot 10^{-4} \div 0.1 \text{ \AA}^{-1}$ - Grenoble

apert=2m & 10m $\Rightarrow \lambda = 8 \text{ \AA}$; apert=36m $\Rightarrow \lambda = 12 \text{ \AA}$

$d = 60 \text{ } 9000 \text{ \AA}$

KWS-2: $Q = 1 \cdot 10^{-3} \text{ } 0.1 \text{ \AA}^{-1}$ - Julich & Garching

apert=2m & 8m $\Rightarrow \lambda = 8 \text{ \AA}$; apert=20m $\Rightarrow \lambda = 12 \text{ \AA}$

$d = 60 \div 6000 \text{ \AA}$

KWS-3: $Q = 1 \cdot 10^{-4} \text{ } 2 \cdot 10^{-3} \text{ \AA}^{-1}$ - Julich & Garching

$\lambda = 12,7 \text{ \AA}$

$d = 3000 \div 60000 \text{ \AA}$

Comparison of scattering curves from chicken erythrocyte nuclei obtained on different spectrometers

Спектры МУРН для целых ядер

KWS-2&KWS-3

D 11

Rat ctrl

Fractals

$d = 1, 2, 3$ – размерность Евклидова пространства;

Масса объёмного или масс-фрактала M с диаметром L и фрактальной размерностью D_m определяется следующим выражением:

$$M = M_0 L^{D_m}$$

M_0 – константа а $D_m \leq d$ Если фрактал связанная структура, то $1 \leq D_m \leq 3$

Площадь поверхностного фрактала A (имеющего нормальную плотность) с диаметром L и фрактальной размерностью D_s определяется выражением:

$$A = A_0 L^{D_s}$$

A_0 – константа а $2 \leq D_s < 3$

Можно показать [P.W. Schmidt], что для масс-фрактала

$$I(q) \sim q^{-D_m} \quad \text{Когда } qL \gg 1 \text{ а } qa \ll 1,$$

A для поверхностного фрактала

$$I(q) \sim q^{-(6-D_s)}$$

в дважды логарифмических координатах для масс фрактальной структуры наклон прямой не может быть больше 3, а для поверхностного фрактала между 3 и 4.

Моделирование и расчет спектров МУРН

2^{20} нуклеосом; $r_{\max} = 120 \text{ Å}$; $l = 300 \text{ Å}$; $n = 2$; $k = 17$;
 $d_{s1} = 2.9$; $d_{s2} = 2.1$

	Hen 99	HeLa 99	HeLaRN A 99	C6 99	DE 99
$D_1=D_m$	-2,5	-2,5	-2,5	-2,3	-2,0
$D_2(D_s)$	-3,3 (2.7)	-3,5 (2.5)	-3,8 (2.2)	-2,7 (D_m)	-3,7 (2.3)
Q_{cr} $\text{\AA}^{-1}$	0,0018	0,005	0.004	0,007	0,094
Q_{cr} HM	350	125	160	90	65
	Hen 40	HeLa 40	HeLaRN A 40	C6 40	DE 40
$D_1=D_m$	-2,2	-2,3	-2,4	-2,2	-2,1
$D_2(D_s)$	-3,4 (2.6)	-3,9 (2.1)	-4,0 (2)	-2,8 (D_m)	-3,3 (2.7)
Q_{cr} $\text{\AA}^{-1}$	0,0019	0,0042	0,0042	0,009	0,012
Q_{cr} HM	330	150	150	70	52

	<i>Hen Gr</i>	<i>Hen MFeb</i>	<i>Hen Gam Gr</i>	<i>Rat Gr</i>	<i>Rat Gam Gr</i>	<i>C6 MFeb</i>	<i>C6 MMay</i>	<i>C6 Rna-s MMay</i>	<i>HeLa MFeb</i>	<i>HeLa MMay</i>	<i>HeLa Rna-s MMay</i>	<i>Fly MMay</i>	<i>Fly MMay Mut</i>	
$D_1 = D_m$														
99% D_2O	2.41	2.51	2.43	2.37	2.23	2.26	2.36	2.36	2.49	2.51	2.51	2.24	2.53	
	$\underline{D}_{mH} = 2.45 \pm 0.05$			$\underline{D}_{mR} = 2.32 \pm 0.07$					$\underline{D}_{mHL} = 2.50 \pm 0.01$			2.24	2.53	
	$\underline{D}_m = 2.4 \pm 0.1$													
40% D_2O	2.27	2.26	2.15	2.44	2.15	2.13	2.27	2.21	2.25	2.32	2.41			
	$\underline{D}_{mH} = 2.23 \pm 0.07$			$\underline{D}_{mR} = 2.24 \pm 0.12$				$\underline{D}_{mHL} = 2.33 \pm 0.08$						
	$\underline{D}_m = 2.25 \pm 0.1$													
$D_2 = -(6 - D_s)$														
99% D_2O	3.08	3.25	3.77	3.48	3.19	(2.7)	3.63	3.2	3.5	4.0	3.75	3.24	3.64	
	$\underline{D}_{2H} = 3.4 \pm 0.4$			$\underline{D}_{2R} = 3.4 \pm 0.2$				$\underline{D}_{2HL} = 3.8 \pm 0.3$			3.24	3.64		
	$\underline{D}_{sH} = 2.6 \pm 0.4$			$\underline{D}_{sR} = 2.6 \pm 0.2$				$\underline{D}_{sHL} = 2.25 \pm 0.3$			2.76	2.36		
	$\underline{D}_2 = 3.5 \pm 0.3$													
	$\underline{D}_s = 2.5 \pm 0.3$													
40% D_2O	3.53	3.37	3.64	3.82	3.19	(2.82)	4.0	3.23	3.96	4.05	4.05			
	$\underline{D}_{2H} = 3.5 \pm 0.1$			$\underline{D}_{2R} = 3.6 \pm 0.4$				$\underline{D}_{2HL} = 4.0 \pm 0.1$						
	$\underline{D}_{sH} = 2.5 \pm 0.1$			$\underline{D}_{sR} = 2.4 \pm 0.4$				$\underline{D}_{sHL} = 2.0 \pm 0.1$						
	$\underline{D}_2 = 3.7 \pm 0.3$													
	$\underline{D}_s = 2.3 \pm 0.3$													

	<i>Hen Gr</i>	<i>Hen MFeb</i>	<i>Hen Gam Gr</i>	<i>Rat Gr</i>	<i>Rat Gam Gr</i>	<i>C6 MFeb</i>	<i>C6 MMay</i>	<i>C6 Rna-s MMay</i>		<i>HeLa MFeb</i>	<i>HeLa MMay</i>	<i>HeLa Rna-s MMay</i>	<i>Fly MMay</i>	<i>Fly MMay Mut</i>
$Q_{cr}(\text{\AA}^{-1}) \cdot 10^{-3}, R_{cr}(\text{nm})$														
99% D₂O	1.5	1.8	1.75	2.2	1.9	(7)	3.7	3.8		5.0	5.2	4.0	4.6	3.8
	$Q_{crH}=1.7 \pm 0.1$			2.0 ± 0.2				3.75 ± 0.07		$Q_{crHL}=4.7 \pm 0.6$			4.6	3.8
	419	349	359	$Q_{crR}=3 \pm 1$						126	121	157	137	165
	$R_{crH}=380 \pm 30$			286	331	(90)	170	165	$R_{crH}=135 \pm 20$			137	165	
				310 ± 30				168 ± 4						
				$R_{crR}=240 \pm 80$										
40% D₂O	1.75	1.9	2.8	2.3	2.6	(9)	3.7	3.2		4.2	6.5	4.2		
	$Q_{crH}=2.2 \pm 0.6$			2.45 ± 0.2				3.5 ± 0.4		$Q_{crHL}=5.0 \pm 1$				
	359	331	224	$Q_{crR}=3.0 \pm 0.6$						150	97	150		
	$R_{crH}=300 \pm 70$			273	242	(70)	170	196	$R_{crH}=130 \pm 30$					
				260 ± 20				180 ± 20						
				$R_{crR}=220 \pm 60$

99% D₂ O

D_m (cp) = 2.4 0.1

D_s (cp) = 2.5 0.3

Fruit Fly

99% D₂ O

D_m = 2.0

D_s = 2.3

40% D₂O (DNA+RNA)

D_m (cp) = 2.25 0.1

D_s (cp) = 2.3 0.3

40% D₂O (DNA+RNA)

D_m = 2.1

D_s = 2.7

NET RESULT: EACH DNA MOLECULE HAS BEEN PACKAGED INTO A MITOTIC CHROMOSOME THAT IS 50,000x SHORTER THAN ITS EXTENDED LENGTH

МУРН – 3 типа упаковки хроматина

Нуклеосомы

Масс-фрактал

Поверхн фрактал

Качественные сходства и различия

Феноменология, полимеры, расплав

колец, Гроссберг

Различия в нуклеосомной упаковке

Моделирование, прямая задача МУРН

Мол динамика

Внесение возмущений в структуру хроматина

Nucleosome

Nucleosome

Благодарности:

ПИЯФ:

**Назаренко В.А.
Лаб клеточной биологии,
Топерверг Б.П.
Воробьев А.**

Юлих, Гаршинг

**Радулеску А.
Иоффе А.И.
Пипич В.**

КИ:

Велихов В.Е.

ОИЯИ:

**Куклин А.И.,
Горделий В.И.
Аксенов В.Л.**

**т29 ОФН Президиума РАН
Грант ФЦП 2012-2013
Грант РФФИ-офи-м 2012-2013
Грант РФФИ-офи-м 2014-2016**

Рис. 14. Последовательные этапы формирования складчатой (фрактальной) глобулы (а–в). Самоподобная структура складчатой глобулы, сегрегированной на всех масштабах (г).

FOLDED POLYMER

Equilibrium
globule

Cross-section view

Fractal
globule

Cross-section view

Фрактальная упаковка
хроматина на уровне ядра

FISH	2,2 (< 1 мкм) ~3 (> 1 мкм)
Hi-C	3 (> 1 мкм)
FCS	2,2 — 2,6 (< 0,1 мкм)